

መድኃኒት ለሚቋቋም የሳንባ ህመም የሚደረገውን ክሊኒካዊ እና በላብራቶሪ ላይ የተመሰረተ ክትትል እንዲሁም ከህክምናው ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳዮችን አስመልክቶ ምን ሊጠበቅ ይችላል?

ጸሃፊ፡ ጄኔራል ፊሬን ትርጉም፡ ሊንድሲ ማኬና መጋቢት 2025

መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም (DR-TB) ሕክምና በጣም ውጤታማ ነው፣ ነገር ግን ህመሙን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውሉ መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳዮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህን በፍጥነት ለመለየት እና ምላሽ ለመስጠት፣ የህክምና አገልግሎት ሰጪዎች እና ህክምና እየተደረገላቸው ያሉ ሰዎች የጎንዮሽ ጉዳዮችን አስቀድመው ሊያመለክቱ የሚችሉ ማሳያዎችን መረዳት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም የህክምና አገልግሎት ሰጪዎች በተቻለ ፍጥነት የጎንዮሽ ጉዳዮችን ለመለየት አስፈላጊ የሆኑ ምርመራዎችን እና ክትትሎችን ሊያደርጉ ይገባል። ጊዜውን የጠበቀ ምርመራ እና ክትትል ማድረግ የህክምናውን የጎንዮሽ ጉዳዮችን አደጋ ለመቀነስ እና ሰዎች በተቻለ ፍጥነት ጤንነታቸውን መልሰው እንዲያገኙ ለማረጋገጥ ወሳኝ መንገዶች ናቸው።

ህክምና ከመጀመሩ በፊት አንዳንድ ምርመራዎች መደረግ አለባቸው። ይህ ብዙውን ጊዜ “የመነሻ” ምርመራ ተብሎ ይጠራል። በህክምናው ወቅት የሚከሰቱትን ለውጦች በተሻለ ለመረዳት እንዲቻል ህክምናው ከመጀመሩ በፊት ምን እየተከሰተ እንዳለ ያረጋግጣል። “የቋሚ ክትትል/ምርመራ” ማለት ምንም ዓይነት የህመም ስሜት ባይኖርም እንኳ መድኃኒት በሚቋቋም የሳንባ ህመም ህክምና ወቅት ለሁሉም ሰው መደረግ ያለባቸው ምርመራዎች/ክትትሎች ማለት ነው። “በህመም ምልክት ላይ የተመሰረተ ምርመራ” የሚያመለክተው በህክምና ላይ ያለ ሰው የተለዩ ችግሮችን ወይም ስጋቶችን ሪፖርት ሲያደርግ የሚደረጉ ምርመራዎችን እና ግምገማዎችን ነው። እነዚህ የምርመራ አይነቶች ኢንደሚክተላው ተብራርተዋል። ሦስቱም የክትትል ምርመራዎች በብሔራዊ የሳንባ ህመም ፕሮግራም ፤ በተለይም መድኃኒት ለሚቋቋም የሳንባ ህመም በተዘጋጀው አጠቃላይ የህክምና ፓኬጅ ውስጥ የተካተቱ ስለሆኑ የህክምና ክትትሉን ለማረጋገጥ ሰዎች ሁሉ ያለ ተጨማሪ ወጪ ይሰጣሉ።

ለታካሚዎች የሚደረጉት የክትትል ምርመራዎች በህክምናው ሂደቱ ውስጥ በተካተቱት መድኃኒቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ ለብዙ መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም ታካሚዎች የሚመከሩ አምስት ዋና ዋና የክምና አሰጣጥ አይነቶች አሉ። የክምና አሰጣጥ ሂደቶቹ ለህክምናው የሚሰጡትን መድኃኒቶችን፣ የጎንዮሽ ጉዳዮቻቸውን እንዲሁም የክትትል ምርመራዎች እና ስልቶችን ይጋራሉ። ይህ ጽሁፍ መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም ያለባቸው ሰዎች ህክምና ሲጀምሩ፣ በህክምናው ወቅት እና የተወሰኑ የጎንዮሽ ጉዳዮችን ወይም ልምዶችን ሪፖርት ሲያደርጉ ሊጠብቋቸው የሚገቡትን የላብራቶሪ ምርመራዎች እና ክሊኒካዊ ምርመራዎች ዝርዝር ያቀርባል።

መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም የተያዙ ሰዎች በሙሉ ህክምና ከመጀመራቸው በፊት የሚከተሉትን የመነሻ ግምገማዎች ማድረግ አለባቸው፡



1. የአክታና የመድኃኒት ተጋላጭነት ምርመራ። የመድኃኒት ተጋላጭነት ምርመራው ቢያንስ 64-ምርጫ እና ፍሎሮኪኖሎኖስ የሚባሉትን የመድኃኒት አይነቶች የመቋቋም ምርመራን ማካተት አለበት። ቢቻል ምርመራው በህክምናው ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሁሉም መድኃኒቶችን በተመለከተ የታካሚውን የመቋቋም ችሎታ እንዲመረምር ይጠበቃል።



2. የደረት የጨረር ምርመራ (የደረት X-ray)



3. የሁሉም የሰውነት ሥርዓቶች አካላዊ ምርመራ። ይህ ምርመራ ከብደትን፣ ቁመትን፣ የማየት ችሎታን እንዲሁም በእጆቹና በእግሮቹ ውስጥ ያሉትን የነርቮች አሠራር መገምገምንም ይጨምራል



4. የልብን የኤሌክትሪክ ሥርዓት ለመፈተሽ የሚደረግ የኤሌክትሮካርዲዮግራም (ECG) ምርመራ



5. የተሟላ የደም ቆጠራ፣ የጉበት ሥራን፣ የኩላሊት ሥራን እና የፖታሲየም መጠን ለመለካት የሚያስችሉ የደም ምርመራዎች



6. የኤች አይ ቪ ምርመራ



7. የእርግዝና ምርመራ፤ እና



8. የአዕምሮ ጤንነት ክትትል፤ የህክምና ክትትል ተግዳሮቶች እና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ አስፈላጊነትን በተመለከተ የሚደረግ ምዘና

መድኃኒት በሚቋቋም የሳንባ ህመም (DR-TB) የተያዙ ሰዎች በህክምና ሂደቱ ውቅት ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ የጤና ባለሙያ እንዲጎበኙ ይጠበቃል። በጉብኝቱ ወቅት የጤና ባለሙያው ስለ ማንኛውም የቲቢ ምልክቶች (ሳል፣ ትኩሳት፣ ክብደት መቀነስ፣ የሌሊት ላብ፣ የመተንፈስ ችግር) መጠየቅ አለበት። በተጨማሪም የቲቢ በሽታ ያለበት ሰው ላይ ሊታዩ የሚችሉ የህክምናውን የጉንደሽ ጉዳዮችን ሊያመለክቱ ስለሚችሉ አዳዲስ ምልክቶች መጠየቅ አለበት። እነዚህ ምልክቶች ማቅለሽለሽ፣ ተቅማጥ፣ የቆዳ ቀለም መቀየር፣ የዓይን ቀለም መቀየር፣ የዕይታ መቀየር፣ የትንፋሽ እጥረት፣ የደረት ሕመም፣ የልብ ምት፣ ራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ፣ ሽፍታ፣ የእጆች ወይም የእግሮች መቃጠል፣ ቅዠት፣ ማዘን፣ የተለመዱ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ፍላጎት ማጣት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ መጨነቅ ወይም የአስተሳሰብ ለውጥ ናቸው።



1. ወርሃዊ የአክታ ምርመራ



2. የሁሉም የሰውነት ሥርዓቶች አካላዊ ምርመራ። ይህ ምርመራ ክብደትን፣ ቁመትን፣ የማየት ችሎታን እንዲሁም በእጆቹና በእግሮቹ ውስጥ ያሉትን የነርቮች አሠራር መገምገምንም ይጨምራል



3. የልብን የኤሌክትሪክ ሥርዓት ለመመርመር የሚደረግ የኤሌትሮካርዲዮግራም (ECG) ምርመራ (ይህም በየ 4-8 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ይደጋገማል)



4. የደም ቆጠራ ለማካሄድ የሚደረጉ የደም ምርመራዎች (linezolid እየወሰዱ ከሆነ በእየወሩ) እና የጉብት ምርመራ (pretomanid ወይም pyrazinamide እየወሰዱ ከሆነ በእየወሩ)



5. የአዕምሮ ጤና ችግሮችን አስመልክቶ የሚደረጉ ክትትሎች፤ እና



6. የህክምና ክትትል ተግዳሮቶችን ለመለየት እና ለማስተካከል የሚደረጉ ክትትሎች

ሰንጠረዥ 1. የሰድስት ወር የክትትል መርሃ ግብር

የምርመራ ዓይነት	ከመጀመሪያ በፊት	ወር 1	ወር 2	ወር 3	ወር 4	ወር 5	ወር 6
የአክታ ምርመራ	X	X	X	X	X	X	X
የደረት ራጅ ምርመራ	X						
በህክምናው ወቅት የተከሰቱ አዳዲስ ምልክቶችን ወይም ችግሮችን መገምገም		X	X	X	X	X	X
የአካላዊ ምርመራ	X	X	X	X	X	X	X
የልብ ምርመራ	X	X		X			
Linezolid በሚወስዱበት ጊዜ የደም ህዋስ ቁጥርን ለመቆጣጠር የሚደረግ የደም ምርመራ	X	X	X	X	X	X	X
pretomanid ወይም pyrazinamide በሚወስዱበት ጊዜ የጉብት ሥራን ለመቆጣጠር የሚደረግ የደም ምርመራ።	X	X	X	X	X	X	X
የኤች አይ ቪ ምርመራ	X						
የአርግዝና ምርመራ፤	X						
የአዕምሮ ጤና ክትትል	X	X	X	X	X	X	X
ማያቋርጥ ድጋፍ ለመስጠት መከታተል	X						
በlinezolid በሚወስዱበት ጊዜ የሚደረግ የዕይታ ምርመራ	X	X	X	X	X	X	X
Linezolid በሚወስዱበት ጊዜ የነርቭ ችግር ምርመራ	X	X	X	X	X	X	X

* የጉብት በሽታ ያለባቸው ወይም የአልኮል ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ፕሪቶማኒድ በሚወስዱበት ጊዜ በየወሩ የጉብት ምርመራ ማድረግ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ኤሎች ሰዎች ፕሪቶማኒድ የሚወስዱ ቢሆንም እንኳን ምርመራውን ማድረግ አይጠበቅባቸውም።

ማንኛውም የህመም ምልክት ያጋጠማቸው ሰዎች ለሚረዳቸው የጤና ባለሙያ ምልክቱን ማሳወቅ አለባቸው። ይህን ሲያደርጉ ከምልክቶቹ ጋር የተያያዘ የሰውነት ሥርዓት ጥልቅ ምርመራ እንደሚደረግላቸው መጠበቅ ይኖርባቸዋል። **ከአካል ምርመራው በተጨማሪ የሚከተሉትን ምልክቶች ለሚያሳዩ ሰዎች የሚከተሉት የላብራቶሪ ምርመራዎች/ግምገማዎች ሊደረጉ ይገባል፤**

-  **ማቅለሽለሽ/ ማስታወክ፣ የቆዳ ወይም የዓይን ቀለም ለውጥ፣ ለጉብት ምርመራዎች የደም ናሙና**
-  **ሽፍታ፣ የቆዳ፣ የዓይን እና የአፍ ሙሉ ምርመራ**
-  **የደረት ሕመም፣ ማዘር፣ ራስን መሳት፣ የትንፋሽ አጥረት፣ የልብ ኤሌክትሪክ ሥርዓትን ለመፈተሽ የልብ ምርመራ፣ የፖታሲየም መጠን ለመፈተሽ የሚደረግ የደም ናሙና**
-  **የድካም ስሜት፣ የትንፋሽ አጥረት፣ የቀለም መቀየር፣ በቀላሉ የሚከሰት ቀኝሰል፣ የደም ናሙና ለሙሉ የደም ህዋስ መጠን ምርመራ**
-  **በእጆች/በእግሮች ላይ የመደንዘዝ/የማቃጠል ስሜት፣ ሙሉ የነርቭ ምርመራ፣ በእጆችና በእግሮች ላይ የሚከሰተውን ቅጽበታዊ እንቅስቃሴ እና ስሜትን ጨምሮ።**
-  **የእይታ ለውጦች፣ ሙሉ የዓይን ምርመራ የእይታ ትክክለኛነትን ጨምሮ፣ የቀለም መለየትን እና ጥልቅ የዓይን ምርመራን ጨምሮ ሙሉ የዓይን ምርመራ (የዓይን ጀርባን ማየት የሚያስችል ብርሃንን/ophthalmoscopy በመጠቀም የሚደረግ)።**

በመደበኛ ክትትል ወይም በምልክቶች ላይ የተመሰረተ ግምገማዎች ማንኛውንም የጎንዮሽ ጉዳት የሚያሳዩ ከሆነ የጤና ባለሙያው በህክምናው አስጣጥ ሂደት ላይ ለውጦችን ያደርጋል። ይህም ችግሮቹን ያስከትላል ተብሎ የተጠረጠረውን መድኃኒት መጠን መቀነስ፣ ችግሮቹን ያስከትላል ተብሎ የተጠረጠረውን መድኃኒት ማቆም ወይም ህክምናውን ሙሉ በሙሉ ማቆም ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም የጤና ባለሙያዎቹ ምልክቶችን ለመቀነስ ሊረዱ የሚችሉ አዳዲስ መድኃኒቶችን ሊመክሩ ይችላሉ፤ መዳኒቶቹም ለታካሚው በነፃ ሊቀርቡ ይገባል ምክንያቱም ይህ የመድኃኒት በሚቋቋም የሳንባ ህመም (DR-TB) ህክምና አካል ነው።

ሰንጠረዥ 2 የተለመዱ መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም (DR-TB) ህክምና የጎንዮሽ ጉዳት ምልክቶችን፣ የሚከሰቱባቸውን ምክንያቶች እና ምልክቶቹን ለመቅረፍ ሊወሰዱ የሚገቡ እርምጃዎችን ያጠቃልላል።

ሰንጠረዥ 2. መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም (DR-TB) የጎንዮሽ ጉዳቶች ምልክቶች፣ መንስኤዎችና እርምጃዎች

ምልክቶች	ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ	ከህመሙ ምልክቶች ጋር ሊዛመዱ የሚችሉ መድኃኒት የሚቋቋም የሳንባ ህመም (DR-TB) መድኃኒቶች	ሊወሰዱ የሚችሉ እርምጃዎች
የማቅለሽለሽ/የማስታወክ ስሜት	የመድኃኒቶች መለወጥ፣ የጉብት ችግር	Pretomanid, pyrazinamide, ማንኛውም የሳንባ ነቀርሳ መድኃኒት ሲጀመር	የደም ምርመራዎችን በማድረግ የጉብት ጤናን ይፈትሹ፤ ትኩረት ያልተሰጣቸውን መድኃኒቶች ላይ በማተኮር እና ማቅለሽለሽ ስሜትን የሚቀንሱ መዳኒቶችን መጠቀም፤ ጉብት ላይ ጉዳት ከተሰተዋለ ጉብት እስኪያገግም ድረስ የቲቢ መድኃኒቶች ማቋረጥ
የቆዳ ቀለም/የዓይን ቀለም መቀየር	የቆዳ ቀለም መለወጥ፣ የጉብት ችግር	Clofazimine, pretomanid, pyrazinamide	የጉብትን ጉዳት በደም ምርመራዎች ይፈትሹ፤ ጉብት ላይ ጉዳት ከተሰተዋለ የቲቢ መድኃኒቶች ጉብት እስኪያገግም ድረስ ሊቆሙ ይችላሉ። Clofazimine ከተቋረጠ በኋላ የቆዳ ቀለም መጨመር ቀስ በቀስ ይጠፋል።

የራስ ማዞር፣ አራስን መሳት፣ የደረት ሕመም	በልብ ውስጥ ባለው የኤሌክትሪክ ስርዓት ላይ የሚከሰቱ ለውጦች	Bedaquiline, clofazimine, levofloxacin, moxifloxacin	ECG፣ የፖላሰየም መጠን በደም ምርመራ ይፈትሹ። በልብ የኤሌክትሪክ ሥርዓት ላይ ለውጦች ከተስተዋሉ የቲቢ መድኃኒቶች ሊቋረጡ ይችላሉ።
የአይታ መቀየር	የዓይን ነርቭ ችግር	Linezolid	የዓይን ምርመራ፣ የዓይን ባለሙያ ማማከር፣ Linezolid መድኃኒት ማቋረጥ
የድካም ስሜት፣ የቆዳ ቀለም መቀየር፣ በቀላሉ የሚከሰት ቁስል ወይም መበለዝ	የደም ሴሎችን ከሚፈጥሩ የአጥንት ሕብረ ህዋሳት ጋር የተያያዙ ችግሮች	Linezolid	የደም ሴል ደረጃን በደም ምርመራዎች ይፈትሹ። ውጤቱ ጤናማ ካልሆነ የ Linezolid መጠን ሊቀነስ ወይም ሊቋረጥ ይችላል።
በእጅ ወይም በእግሮች ላይ የማቃጠል፣ የመደነዘዝ እና የሚወጋ ስሜት	የነርቭ ችግር	Linezolid	የእጆች እና እግሮች ነርቮች አካላዊ ምርመራ። ውጤቱ ያልተለመደ ከሆነ፣ የlinezolid መጠን ሊቀነስ ወይም ሊቆም ይችላል።
የመገጣጠሚያ/የጡንቻ ሕመም	የጡንቻዎች እና የመገጣጠሚያዎች መለስተኛ ህመም	Levofloxacin, moxifloxacin, pyrazinamide	የመገጣጠሚያዎች እና የጡንቻዎችን አካላዊ ምርመራ እና ህመሙን ማቀነስ መድኃኒቶች መጠቀም።
ቅዠቶች፣ የአስተሳሰብ ለውጥ	መድኃኒቱ በአንጎል ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ	Delamanid	ራስን ወይም ሌሎችን የመጉዳት አደጋ አለመኖሩን ማረጋገጥ፣ ለአንቅልፍ የሚረዱ መድኃኒቶችን መጠቀም እና Delamanidን ማቋረጥ

ህክምናው ከተጠናቀቀ በኋላም ከትትል መደረጉ መቀጠል አለበት። ይህ የሚደረገው የቲቢ በሽታ መመለሱን ወይም እንደገና መከሰቱን የሚያመለክቱ አዳዲስ ምልክቶችን ለመለየት ነው (ለምሳሌ አዲስ ሳል፣ አዲስ ትኩሳት፣ አዲስ የክብደት መቀነስ)። በተጨማሪም በሳንባ ነቀርሳ በሽታ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ የረጅም ጊዜ የጤና ጉዳዮችን ለመከታተል ይከናወናል። እነዚህ የጤና ችግሮች አንዳንድ ጊዜ “የሳንባ ህመም ተከታይ በሽታ” ተብለው ይጠራሉ። የመተንፈስ ችግር፣ የትንፋሽ እጥረት፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን የማከናወን ችግር፣ ወዘተ ሊያካትቱ ይችላሉ። በአንዳንድ የክምና ተቋማት ህክምናው ከተጠናቀቀ በኋላ የሚደረገው ከትትል በሳንባ ህመም ህክምናው ውስጥ ባልተሳተፈ የህክምና ባለሙያ ወይም በሳንባ ሐኪም የሚከናወን ይሆናል። ይሁን እንጂ የሳንባ ህክምና ላይ የተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች ታክመው የዳኑ ሰዎችን ለመገምገም እና ተጨማሪ የሳንባ ነቀርሳ ምርመራዎችን ወይም ሌሎች አስፈላጊ ምርመራዎችን ወይም በሳንባ በሽታ ሳቢያ የተከሰቱትን የመተንፈሻ አካላት በሽታ ወይም ሌሎች የጤና ችግሮችን ለመፍታት እርምጃዎችን በመውሰድ ለማገዝ ፈቃድ እና ችሎታው ሊኖራቸው ይገባል።